

トゲナナフシバチ *Calosega kamiteta* の新産地寺山 守¹⁾・須田 博久²⁾

(1) 〒339-0054 さいたま市岩槻区仲町2-12-29 (2) 〒285-0034 佐倉市千成2-13-8)

Mamoru TERAYAMA and Hirohisa SUDA : A New Locality of *Calosega kamiteta* (Hymenoptera, Chrysididae, Amiseginae)

セイボウ科，ナナフシバチ亜科のトゲナナフシバチ *Calosega kamiteta* Terayama, 1999は，これまで南西諸島のみを得られている種で，八重山諸島の西表島，石垣島 (Terayama, 1999) および沖縄島，奄美大島 (三田, 2004) からの記録がある．今回，宮古諸島の宮古島と伊良部島から本種を採集した．また，本土の愛知県からも本種が得られている．以上を新産地として報告する．

愛知県産の貴重な標本を御恵与下さった山岸健三博士 (名城大学農学部) にお御礼を申し上げる．

検視標本. 1♀, 沖縄県宮古郡 (現宮古島市) 上野村野原 (大嶽城址公園) [宮古島], 20.iv.2005, 須田博久採集. 1♀, 沖縄県宮古郡伊良部町池間添 [伊良部島], 21.iv.2005, 須田博久採集.

1♂, Yawata (650m), Asahi, Aichi Pref. [旧東賀茂郡旭町八幡 : 2005年4月豊田市へ編入], 18-28.vii.1998, M. Ozawa leg.

本種のメス個体はオスに比べて若干大型で，体長4mm程度である (オスは体長約3mm)．




図1, 2. トゲナナフシバチ *Calosega kamiteta* Terayama, 1999, オス
1, 頭部, 正面観 ; 2, 胸部, 側面.

参 考 文 献

Terayama, M., 1999. Descriptions of new species and genera of the Chrysoidea (Insecta: Hymenoptera) from the Ryukyus, Japan. Biogeography, 1 : 99-106.

三田敏治, 2004. ナナフシヤドリバチ類2種の新産地. つねきばち, 3 : 59.